

Lista 1 - Introdução à Álgebra Linear

1. Escreva as soluções do sistema

$$\begin{cases} x + 2y - z + w - t = 0 \\ x - y + z + 3w - 2t = 0 \end{cases}$$

como combinações lineares de n -uplas ($n = 5$).

2. Escreva as soluções da equação $x - 3y - z + 2w = 0$ como combinações lineares de quádruplas de duas maneiras:

- (a) tirando x em função das outras incógnitas;
- (b) tirando y em função das outras incógnitas.

A seguir, obtenha as soluções $(2, 1, 1, 1)$ e $(-3, 2, -5, 2)$ utilizando as expressões obtidas em (a) e (b).

3. No conjunto $V = \{(x, y) \mid x, y \in \mathbb{R}\}$ definimos “adição” assim:

$$(x_1, y_1) + (x_2, y_2) := (x_1 + x_2, 0)$$

e multiplicação por escalar como no \mathbb{R}^2 , ou seja, para cada $a \in \mathbb{R}$,

$$a(x, y) := (ax, 0).$$

Nessas condições V é um espaço vetorial sobre \mathbb{R} ? Por quê?

4. No conjunto V do exercício anterior definimos a “adição” como o fazemos habitualmente no \mathbb{R}^2 e a multiplicação por escalares assim:

$$a(x, y) := (ax, 0).$$

É então V um espaço vetorial sobre \mathbb{R} ? Por quê?

5. Considere a regra usual para somar vetores no \mathbb{R}^2 e o conjunto $V = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y = x^2\} \subset \mathbb{R}^2$. Vale a propriedade “ $a, b \in V \Rightarrow a + b \in VV$ é um espaço vetorial com as regras usuais para somar vetores e multiplicar vetor por escalar no \mathbb{R}^2 ?

6. No espaço vetorial da matrizes $\mathbf{M}_{3 \times 2}(\mathbb{R})$, consideremos os vetores:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

- (a) Calcular $2A + B - 2C$;

(b) Clacular $X \in \mathbf{M}_{3 \times 2}(\mathbb{R})$ tal que $\frac{A + X}{2} - \frac{X - B}{3} = C$;

(c) Existem $t_1, t_2 \in \mathbb{R}$ de maneira que $A = t_1B + t_2C$?

7. No espaço vetorial $\mathcal{P}_3(\mathbb{R})$ sejam dados os vetores $f(t) = t^3 - 1$, $g(t) = t^2 + t - 1$ e $h(t) = t + 2$.

(a) Clacular $2f(t) + 3g(t) - 4h(t)$;

(b) Existe $k \in \mathbb{R}$ de maneira que $f(t) + k \cdot g(t) = h(t)$?

(c) Existem $k_1, k_2 \in \mathbb{R}$ tais que $f(t) = k_1 \cdot g(t) + k_2 \cdot h(t)$?

8. No \mathbb{R}^2 consideremos os vetores $u = (1, 1)$, $v = (3, -2)$ e $w = (3, 2)$. Resolver a equação $\frac{x+u}{2} + \frac{v+x}{3} = w$, na incógnita $x \in \mathbb{R}^2$.

9. Seja V um espaço vetorial sobre \mathbb{R} . Mostre que $0 \cdot v = 0$ para todo vetor $v \in V$.

10. Seja $S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y + z = 0\}$ um plano do \mathbb{R}^3 passando pela origem. Mostre que S é um espaço vetorial sobre \mathbb{R} .

11. Descreva o espaço vetorial das soluções do seguinte sistema linear:

$$\begin{cases} x + y + 2z &= 0 \\ 2x + 2y + 5z + 3w &= 0 \\ 4x + 4y + 10z + 3w &= 0 \end{cases}$$